

Campagna Antinfluenzale 2018- 2019



La vaccinazione è offerta gratuitamente alle seguenti categorie raccomandate

1. Soggetti di età pari o superiore a 65 anni (nati nell'anno 1953 e precedenti)
 2. Bambini di età superiore ai 6 mesi ed adulti, affetti da patologie croniche, quali:
 - malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (*inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica, la broncopatia cronico ostruttiva - BPCO*)
 - malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
 - diabete mellito e altre malattie metaboliche (*inclusi gli obesi con BMI >30*)
 - malattie renali con insufficienza renale
 - malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
 - epatopatie croniche
 - tumori
 - malattie congenite o acquisite che comportino carenza produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
 - malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
 - patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
 - patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (*ad es. malattie neuromuscolari*).
 3. Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale
 4. Donne che si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza all'inizio della stagione epidemica
 5. Persone residenti presso strutture socio-sanitarie, per anziani o disabili
 6. Medici e personale sanitario di assistenza, personale di assistenza case di riposo ed anziani a domicilio, volontari dei servizi sanitari di emergenza
 7. Persone conviventi con soggetti portatori di patologie di cui al punto 2
 8. Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali (suini e volatili) che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (certificati dal medico competente: addetti alle attività di allevamento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, veterinari pubblici e libero-professionisti)
 9. Forze di Polizia e Vigili del Fuoco
 10. Donatori di Sangue
- ➔ Ricordarsi di portare la Tessera Sanitaria - CRS (o in mancanza il Codice Fiscale)
- ➔ Per le categorie a rischio per patologia, ricordarsi di portare il tesserino di esenzione o la richiesta del Medico di famiglia o altra documentazione sanitaria

La vaccinazione antipneumococcica nell'adulto

L'agente eziologico

Lo Pneumococco è un batterio molto diffuso che si ritrova comunemente nel tratto respiratorio superiore (naso e gola) di persone sane. Si valuta che il 30-70% delle persone sane, i bambini più frequentemente degli adulti, sia portatore dello Pneumococco che, in condizioni normali di immunità, si localizza nelle vie aeree senza dare alcun disturbo e segno di sé.

Come si trasmette

Lo Pneumococco circola con facilità da soggetto a soggetto; la trasmissione avviene attraverso l'aria tramite le goccioline di saliva emesse con starnuti, tosse o con il semplice parlare.

Sintomi

L'infezione si manifesta solitamente con sintomi a carico del tratto respiratorio superiore, dando quadri di sinusite e otite. Nel caso in cui i germi si riproducano in distretti del corpo dove normalmente non sono presenti, come il sangue, il liquor (liquido trasparente che avvolge il cervello e il midollo spinale) o i polmoni, la malattia si manifesta in forma grave (batteriemia, meningite e polmonite). Queste gravi forme di infezione, dette forme invasive, possono progredire fino alla sepsi, una condizione ad elevatissima mortalità caratterizzata dalla invasione disseminata dei batteri nel sangue.

Chi vaccinare

Il vaccino è raccomandato nei bambini sotto i 2 anni d'età e nelle persone che hanno più di 50 anni. Inoltre viene fortemente raccomandato nelle persone di qualsiasi età che presentano particolari condizioni a rischio quali patologie che deprimono il sistema immunitario, malattie croniche (malattie polmonari croniche, diabete, cardiopatie, malattie del fegato, insufficienza renale, malattie del sangue) e persone a cui è stata tolta la milza.

Il vaccino

Il vaccino utilizzato è quello coniugato, che protegge nei confronti dei 13 ceppi responsabili della maggior parte delle infezioni più gravi nei bambini e negli anziani. È un vaccino molto sicuro ed efficace. Può avere lievi effetti collaterali locali, come qualunque altro farmaco; tuttavia la probabilità che un qualunque vaccino possa causare un danno rilevante, è molto bassa.

Come eseguire la prestazione

• La vaccinazione è gratuita per le categorie a rischio e è prenotabile presso il Servizio Vaccinazione dell'ASST di Crema.

CATEGORIE: malattie polmonari croniche; cardiopatie croniche; asplenia anatomica o funzionale; diabete mellito, in particolare se in difficile compenso; immunodeficienze congenite o acquisite; cirrosi epatica; epatopatie croniche evolutive da alcolismo; insufficienza renale cronica; sindrome nefrosica; trapianto d'organo o di midollo; HIV-positivi; portatori di impianto cocleare; fistole liquorali; leucemie, linfomi, mieloma multiplo; anemia falciforme e talassemia; neoplasie diffuse

• La vaccinazione inoltre è da quest'anno offerta gratuitamente in co-somministrazione con l'antinfluenzale a tutte le persone di 65 anni (nati nel 1953).

Informazioni

- Per informazioni sulla patologia è possibile chiedere al Medico di Reparto o al proprio Medico di Medicina Generale
- Per informazioni sulla vaccinazione antipneumococcica, è possibile contattare il Servizio Vaccinazioni:

ASST di Crema – dal lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 12.00 al numero 0373 218577